

SPÄTNÁ VÄZBA 426

ČÍS.PODNETU	426
NÁZOV	SPÄTNÁ VÄZBA 426
NÁZOV DOKUMENTU	spatna_vazba_426
OBLASŤ	Zdravotný výkon
PODNET	Požiadavka na nové ZV
ODPOVEĎ	ZV boli pridané do ZZV
DÁTUM OTÁZKY	30.03.2023
DÁTUM ODPOVEDE	28.03.2024

ZOSUMARIZOVANÝ PODNET

Kód zdrav.výkonu:

- 6xxxx.1 Podanie spesolimumabu, parenterálne, 900 mg; 6xxxx.2 Podanie lieku spesolimumab, parenterálne, 1800 mg

Popis súčasného stavu:

- Liečba akútneho vzplanutia generalizovanej pustulóznei psoriázy je zameraná na liečbu symptómov (kortikoidy, analgetiká, antipyretiká, lokálna liečba kožných prejavov).

Liek Spevigo (spesolimumab) je podľa SPC určený na cielenú liečbu vzplanutí generalizovanej pustulóznei psoriázy u dospelých pacientov.

Navrhované riešenie s zdôvodnením:

- Zaradenie parenterálneho podania lieku spesolimumab do Zoznamu zdravotných výkonov.

- Generalizovaná pustulózna psoriáza je jednou z najťažších foriem ochorení kože.

Charakterizovaná je rýchlym, náhle vznikajúcim nástupom, na koži sú patologické zápalové eflorescencie veľkých rozmerov, na ktorých sa postupne objavujú pustuly s purulentným obsahom. Rozsiahly lokálny nález na koži má odozvu na celkovom klinickom stave pacienta, prechádzajúcom až do obrazu sepsy. Spesolimumab je humanizovaná monoklonálna protilátka, ktorá inhibuje receptor interleukínu-36R a ním sprostredkovanú signalizačnú dráhu. Väzba spesolimabu na IL36R zabraňuje následnej aktivácii IL36R príbuznými ligandmi a „downstream“ aktivácii prozápalových dráh. Po liečbe spesolimabom u pacientov s generalizovanou pustulóznou psoriázou sa po 1. týždni v porovnaní s počiatočnými hodnotami pozorovali znížené hladiny C-reaktívneho proteínu, interleukínu 6, cytokínov sprostredkovaných T-pomocnými bunkami, zápalových markerov sprostredkovaných keratinocyty, neutrofilových mediátorov a prozápalových cytokínov v sére a v koži, ktoré sa spájali so znížením klinickej závažnosti a významnou redukciou lokálnych kožných prejavov. Klinická štúdia potvrdila účinnosť lieku: 54,3 % pacientov, ktorým bol podaný spesolimumab, dosiahli po jednom týždni subskóre pustulácie podľa GPPGA 0 (Generalised Pustular Psoriasis Physician Global Assessment, GPPGA), t.j. bez viditeľných pustúl. Vo výnimočných prípadoch môže byť pri nižšej efektivite a pretrvávaní príznakov podaná s odstupom 1 týždňa dodatočná dávka (900 mg) lieku. Spesolimumab je účinným terapeutickým prostriedkom na akútne stavy vzplanutia generalizovanej pustulóznei psoriázy.

ODPOVEĎ

Zdravotné výkony boli zapracované do ZZV 2024 pod kódom 64388.-.

ZOZNAM SKRATIEK

SKRATKA	VYSVETLENIE
ADRG	ZÁKLADNÁ DRG SKUPINA
CKS DRG	CENTRUM PRE KLASIFIKAČNÝ SYSTÉM DRG
DOD	DĹŽKA OŠETROVACEJ DOBY
DP	DEFINIČNÁ PRÍRUČKA (MANUÁL ALGORITMOV POPISUJÚCI ZARADENIE HOSPITALIZAČNÝCH PRÍPADOV (HP) DO DRG SKUPÍN)
DRG	DIAGNOSTICKO-TERAPEUTICKÉ SKUPINY (DIAGNOSIS-RELATED GROUP)
EMZS	EXTRAMURÁLNA ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ (SVLZ MIMO PÚZS)
ERV	EFEKTÍVNA RELATÍVNA VÁHA (VYJADRENIE NÁKLADOVOSTI DANEJ DRG SKUPINY VZHĽADOM NA OŠETROVACIU DOBU)
HDG	HLAVNÁ DIAGNÓZA
HP	HOSPITALIZAČNÝ PRÍPAD
IMZS	INTRAMURÁLNA ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ (SVLZ V RÁMCI PÚZS)
INEK	INSTITUT FÜR DAS ENTGELTSYSTEM IM KRANKENHAUS (G-DRG)
JAS	JEDNODŇOVÁ AMBULANTNÁ STAROSTLIVOSŤ
JZS	JEDNODŇOVÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
KH	KOEFICIENT HOMOGENITY – VYJADRUJE HOMOGENITU NÁKLADOV VŠETKÝCH HOSPITALIZAČNÝCH PRÍPADOV ZARADENÝCH DO DANEJ DRG SKUPINY (JEHO HRANIČNÁ HODNOTA JE 50 %)
KPP	KATALÓG PRÍPADOVÝCH PAUŠÁLOV
NIS	NEMOCNIČNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM
OD	OŠETROVACIA DOBA
PCCL	STUPEŇ KLINICKEJ ZÁVAŽNOSTI PRÍPADU (PATIENT CLINICAL COMPLEXITY LEVEL)
PP	PRÍPOČÍTEĽNÁ POLOŽKA
PÚZS	POSKYTOVATEĽ ÚSTAVNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
RV	RELATÍVNA VÁHA (VYJADRENIE RELATÍVNEJ NÁKLADOVOSTI DANEJ DRG SKUPINY VOČI OSTATNÝM SKUPINÁM)
SND	SKUPINA NÁKLADOVÝCH DRUHOV
SNS	SKUPINA NÁKLADOVÝCH STREDÍSK
SVALZ	SPOLOČNÉ VYŠETROVACIE A LIEČEBNÉ ZLOŽKY
ŠZM	ŠPECIÁLNY ZDRAVOTNÍCKY MATERIÁL
ZP	ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA
ZV	ZDRAVOTNÝ VÝKON
ZZV	ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV