

SPÄTNÁ VÄZBA 731

ČÍS.PODNETU	731
NÁZOV	SPÄTNÁ VÄZBA 731
NÁZOV DOKUMENTU	spatna_vazba_731
OBLASŤ	Pravidlá kódovania
PODNET	Vykazovanie výkonu sekundárny cisársky rez
ODPOVEĎ	Usmernenie k vykazovaniu
DÁTUM OTÁZKY	29.11.2024
DÁTUM ODPOVEDE	31.10.2025

ZOSUMARIZOVANÝ PODNET

Poprosíme o usmernenie pri vykazovaní pôrodu pri hroziacej ruptúre maternice s akútnym ukončením pôrodu cisárskym rezom (ruptúra nenastala). V MKCH pracujeme s 2 diagnózami vzťahujúcimi sa k jazve na maternici (O34.2) alebo ruptúre maternice (O71.x). V klinickom prípade, ak má pacientka bolesti v oblasti dolného segmentu spojené s hroziacou ruptúrou maternice a pôrod je ukončený akútnym cisárskym rezom vykazujeme kombinácia dg O34.2 s výkonom sekundárneho cisárskeho rezu 5r315.2. Perioperačne nález v oblasti dolného segmentu bez dehiscencie či ruptúry. Daná kombinácia nie je zo strany poisťovní akceptovaná s odôvodnením že dg O34.2 je spojená s primárnym cisárskym rezom. No diagnózu O71.x nemôžeme vykázat nakoľko reálna ruptúra maternice nenastala.

Navrhované riešenie s zdôvodnením:

Špecifikovať kódovanie hroziacej ruptúry maternice. Zohľadniť pravidlo D0304 Začínajúca alebo hroziaca choroba.

Určenie jednotného kódovania stanoví správny postup.

ODPOVEĎ

1. Pravidlo D0304: Ak kód pre chorobu, ktorá sa opisuje ako „začínajúca“ alebo „hroziaca“ neexistuje, tak sa nekóduje.
2. Ak pre stav alebo ochorenie existuje v PK špeciálne pravidlo, má nadradenú platnosť pred všeobecným pravidlom. Pre kódovanie cisárskych rezov existuje špeciálne pravidlo S1518.
3. V pravidle S1518 je sekundárny cisársky rez (vrátane urgentného cisárskeho rezu) definovaný ako cisársky rez, ktorý je nevyhnutný v dôsledku **urgentnej situácie v priebehu pôrodu** z indikácie ohrozenia matky alebo dieťaťa.
4. U tehotnej po cisárskom reze v minulosti je v III. trimestri vykonávané ultrazvukové vyšetrenie s meraním hrúbky jazvy na dolnom segmente maternice za účelom stanovenia spôsobu vedenia pôrodu. Meranie sa vykonáva spravidla v 36. – 38. týždni tehotenstva za účelom predikcie rizika ruptúry maternice. [in: Dosedla, E.: Ultrazvuková charakteristika jazvy po cisárskom reze. UPJŠ Košice, 2020].
5. V prípade ukončenia tehotenstva cisárskym rezom vykonaným u rodičky po predchádzajúcej sekcii v minulosti z dôvodu prevencie ruptúry maternice nie je splnená podmienka „urgentnej situácie v priebehu pôrodu“, t.j. nie je možné vykazovať kód sekundárneho cisárskeho rezu.

ZOZNAM SKRATIEK

SKRATKA	VYSVETLENIE
CKS DRG	CENTRUM PRE KLASIFIKAČNÝ SYSTÉM DRG
DOD	DĹŽKA OŠETROVACEJ DOBY
DP	DEFINIČNÁ PRÍRUČKA (MANUÁL ALGORITMOV POPISUJÚCI ZARADENIE HOSPITALIZAČNÝCH PRÍPADOV (HP) DO DRG SKUPÍN)
DRG	DIAGNOSTICKO-TERAPEUTICKÉ SKUPINY (DIAGNOSIS-RELATED GROUP)
ERV	EFEKTÍVNA RELATÍVNA VÁHA (VYJADRENIE NÁKLADOVOSTI DANEJ DRG SKUPINY VZHĽADOM NA OŠETROVACIU DOBU)
HDG	HLAVNÁ DIAGNÓZA
HP	HOSPITALIZAČNÝ PRÍPAD
JZS	JEDNODŇOVÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
KPP	KATALÓG PRÍPADOVÝCH PAUŠÁLOV
NIS	NEMOCNIČNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM
OD	OŠETROVACIA DOBA
PCCL	STUPEŇ KLINICKEJ ZÁVAŽNOSTI PRÍPADU (PATIENT CLINICAL COMPLEXITY LEVEL)
PP	PRIPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA
PÚZS	POSKYTOVATEĽ ÚSTAVNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
RV	RELATÍVNA VÁHA (VYJADRENIE RELATÍVNEJ NÁKLADOVOSTI DANEJ DRG SKUPINY VOČI OSTATNÝM SKUPINÁM)
SVLZ	SPOLOČNÉ VYŠETROVACIE A LIEČEBNÉ ZLOŽKY
ŠZM	ŠPECIÁLNY ZDRAVOTNÍCKY MATERIÁL
VDG	VEDĽAJŠIA DIAGNÓZA/VEDĽAJŠIE DIAGNÓZY
ZP	ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA
ZV	ZDRAVOTNÝ VÝKON
ZZV	ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV