

SPÄTNÁ VÄZBA 758

ČÍS.PODNETU	758
NÁZOV	SPÄTNÁ VÄZBA 758
NÁZOV DOKUMENTU	spatna_vazba_758
OBLASŤ	Pravidlá kódovania
PODNET	Zaradenie nových kódov diagnóz a výkonov
ODPOVEĎ	Návrh nebol odsúhlasený
DÁTUM OTÁZKY	25.03.2025
DÁTUM ODPOVEDE	31.10.2025

ZOSUMARIZOVANÝ PODNET

Podávam návrh o doplnenie nasledovných diagnóz:

• Leukopénia • Stav krvácavosti zapríčinený antiagreganciami • Astma bronchiálne exacerbovaná (sú kódy na astmu, ale buď je bližšie neurčená, alebo zmiešaná alebo alergická) • Prediabetes • Hyperkalcémia (nemyslím tým diagnózu „iná porucha metabolizmu vápnika“) • Pancytopenia (aby sa nemusela osobitne kódovať anémia, trombocytopenia a neutropénia) • Fibrilácia predsiení • Pneumoperitoneum • Peritonitída • Defekt predkolenia • Hematóm (nie kód T810) • Kolitída colon ascendens • Flebitída hornej končatiny (diagnóza bez trombózy)

Doplnenie výkonov:

• Venepunkcia • Zavedenie Midline • Zavedenie PMK

Navrhované riešenie s zdôvodnením:

- doplnenie nových kódov diagnóz a diagnóz výkonov

Pre dané diagnózy chýbajú kódy, ktoré jednoznačne určia diagnózu.

ODPOVEĎ

Pre kódovanie stavov, ktoré sú uvedené v návrhu, sa používajú nasledovné diagnózy zaradené v MKCH-10-SK:

- Leukopénia – kóduje sa ochorenie/stav, ktorý leukopénia spôsobuje; v prípade izolovane zistenej leukopénie ide o abnormálny laboratórny nález, ktorý sa bez ďalšej terapeutickej intervencie nekóduje (pravidlo D0204)
- Stav krvácavosti zapríčinený antiagreganciami – v prípade prítomnosti krvácavých komplikácií sa kóduje diagnóza D68.30 Stav krvácavosti zapríčinený antikoagulanciami a doplňujúca diagnóza Y44.4 Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití: antitrombotické lieky (inhibítory agregácie trombocytov)
- Astma bronchiálne exacerbovaná (sú kódy na astmu, ale buď je bližšie neurčená, alebo zmiešaná alebo alergická) – podľa pravidla D0303 sa kóduje akútny stav nasledovaný chronickou formou ochorenia
- Prediabetes – správna diagnóza podľa MKCH-10 je R73.0 Abnormálny glukózový tolerančný test; v MKCH-10-SK je v poznámkach uvedené, ide o: Diabetes mellitus: latentný, subklinický; Poruchu tolerancie glukózy; Prediabetes
- Hyperkalcémia – kód diagnózy E83.58 Iná porucha metabolizmu vápnika je správna pre vyjadrenie hyperkalcémie, na túto diagnózu odkazuje aj abecedný index Medzinárodnej klasifikácie chorôb
- Pancytopenia – kódovanie pancytopenie usmerňuje MKCH-10. Pri diagnóze D61.- Iná aplastická anémia je v poznámkach v MKCH uvedené: „Pri súčasnej trombocytopenii použiť prídavné kódy

(D69.4-, D69.5-, D69.6-), pri súčasnej agranulocytóze a neutropénii použiť prídavný kód (D70.-)“. Pancytopenia sa v súlade s MKCH-10-SK kóduje tromi kódmi

- Fibro-flutter predsiení – kóduje sa dvomi diagnózami: jednou pre fibriláciu, jednou pre flutter alebo je možné použitie diagnózy I48.9 Fibrilácia a flater predsiení, bližšie neurčené
- Pneumoperitoneum – kóduje sa dôvod vzniku pneumoperitonea, ochorenie alebo stav, ktorý viedol k vzniku pneumoperitonea
- Peritonitída – MKCH-10-SK obsahuje diagnózu K65.- Zápal pobrušnice
- Defekt predkolenia – kóduje sa podľa etiológie vzniku defektu (gangréna, arteriálny alebo venózný pôvod); pre nezistený dôvod alebo ak neexistuje v MKCH-10-SK špecifický kód choroby kóduje sa L97 Vred predkolenia, nezatriedený inde
- Hematóm (nie kód T810) – MKCH-10 obsahuje dostatok špecifických kódov pre hematómy; najčastejšie sa hematóm kóduje podľa lokalizácie a podľa príčiny vzniku: napr. úrazové hematómy mozgu a mozočku S06.-, hematómy jednotlivých orgánov pri poraneniach – diagnózy v XIX. kapitole MKCH-10-SK-2024; hematóm v kĺbe (hemartros) M25.-, hematóm vo vajíčkovode N83.6, hematóm pôrodnickej rany O90.2, kefalhematóm P12.0 atď.
- Kolitída colon ascendens – používa sa kód pre „inú“ kolitídu
- Flebitída hornej končatiny (diagnóza bez trombózy) – podľa všeobecného pravidla kódovania D0501 Konvencie použité v systematickom zozname MKCH spojka „a“ v názve diagnózy vyjadruje „a/alebo“. Diagnóza „Trombóza, flebitída a tromboflebitída“ vyjadruje buď súčasnú prítomnosť trombózy a flebitídy (= tromboflebitída) alebo izolovanú prítomnosť len jedného príznaku, t.j. buď len trombózy alebo len flebitídy. V poznámke k uvedenej skupine diagnóz (I80.-) je uvedené, že sem patrí endoflebitída, periflebitída, hnisová flebitída, zápal žíl.

Nové kódy výkonov:

Podľa pravidla kódovania V0208: Zdravotné výkony, ktoré sa vykonávajú rutinne, opakovane, u väčšiny pacientov alebo mnohonásobne počas hospitalizácie, nie je potrebné v systéme DRG kódovať. Náklad na tieto výkony zohľadňuje už samotná hlavná alebo vedľajšia diagnóza alebo iné zdravotné výkony.

Bežne vykonávanú venepunkciu alebo zavedenie močového katétra nie je potrebné osobitne kódovať a vykazovať.

ZOZNAM SKRATIEK

SKRATKA	VYSVETLENIE
CKS DRG	CENTRUM PRE KLASIFIKAČNÝ SYSTÉM DRG
DOD	DĹŽKA OŠETROVACEJ DOBY
DP	DEFINIČNÁ PRÍRUČKA (MANUÁL ALGORITMOV POPISUJÚCI ZARADENIE HOSPITALIZAČNÝCH PRÍPADOV (HP) DO DRG SKUPÍN)
DRG	DIAGNOSTICKO-TERAPEUTICKÉ SKUPINY (DIAGNOSIS-RELATED GROUP)
ERV	EFEKTÍVNA RELATÍVNA VÁHA (VYJADRENIE NÁKLADOVOSTI DANEJ DRG SKUPINY VZHĽADOM NA OŠETROVACIU DOBU)
HDG	HLAVNÁ DIAGNÓZA
HP	HOSPITALIZAČNÝ PRÍPAD
JZS	JEDNODŇOVÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
KPP	KATALÓG PRÍPADOVÝCH PAUŠÁLOV
NIS	NEMOCNIČNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM
OD	OŠETROVACIA DOBA
PCCL	STUPEŇ KLINICKEJ ZÁVAŽNOSTI PRÍPADU (PATIENT CLINICAL COMPLEXITY LEVEL)
PP	PRIPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA
PÚZS	POSKYTOVATEĽ ÚSTAVNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
RV	RELATÍVNA VÁHA (VYJADRENIE RELATÍVNEJ NÁKLADOVOSTI DANEJ DRG SKUPINY VOČI OSTATNÝM SKUPINÁM)
SVLZ	SPOLOČNÉ VYŠETROVACIE A LIEČEBNÉ ZLOŽKY
ŠZM	ŠPECIÁLNY ZDRAVOTNÍCKY MATERIÁL
VDG	VEDĽAJŠIA DIAGNÓZA/VEDĽAJŠIE DIAGNÓZY
ZP	ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA
ZV	ZDRAVOTNÝ VÝKON
ZZV	ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV